Электрохимическая термодинамика

$$d\bar{G} = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i + F \sum_i z_i \varphi dN_i$$

$$\bar{\mu}_i = \left(\frac{\partial \bar{G}}{\partial N_i} \right)_{p, T, N_{j \neq i}} = \mu_i + z_i F \varphi$$

$$\varphi^\alpha = \psi^\alpha + \chi^\alpha$$

$$\bar{\mu}_i^\beta - \bar{\mu}_i^\alpha = (\mu_i^\beta - \mu_i^\alpha) + z_i F (\varphi^\beta - \varphi^\alpha)$$

- Электрическую разность потенциалов можно измерить только между точками в одной фазе

- **Граница двух металлов:**

$$e^-(M_1) \rightleftharpoons e^-(M_2) \quad \longrightarrow \quad \bar{\mu}_e^{M_1} = \bar{\mu}_e^{M_2} \quad \longrightarrow \quad \mu_e^{M_1} - F\varphi^{M_1} = \mu_e^{M_2} - F\varphi^{M_2} \quad \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \quad \Delta_{M_1}^{M_2} \varphi = \varphi^{M_2} - \varphi^{M_1} = \frac{\mu_e^{M_2} - \mu_e^{M_1}}{F}$$

- **Граница металл/раствор:** $M^{z+}(\text{металл}) \rightleftharpoons M^{z+}(\text{раствор})$

$$\bar{\mu}_{M^{z+}}^M = \bar{\mu}_{M^{z+}}^p \quad \longrightarrow \quad \mu_{M^{z+}}^M + z_+ F \varphi^M = \mu_{M^{z+}}^p + z_+ F \varphi^p \quad \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \quad \Delta_p^M \varphi = \varphi^M - \varphi^p = \frac{\mu_{M^{z+}}^p - \mu_{M^{z+}}^M}{z_+ F} \quad \longrightarrow \quad \mu_{M^{z+}}^p = \mu_{M^{z+}}^{0,p} + RT \ln a_{M^{z+}}$$

$$\Delta_p^M \varphi = \text{const} + \frac{RT}{z_+ F} \ln a_{M^{z+}}$$

(Уравнение Нернста, 1889 г.)

Равновесная э/х цепь: электрохимическое равновесие наблюдается на каждой фазовой границе, а разность потенциалов на концах цепи E скомпенсирована разностью потенциалов от внешнего источника тока

Электродвижущая сила (E) – разность потенциалов на концах равновесной электрохимической цепи

$$E = E_{\text{пр}} - E_{\text{л}}$$

$$\Delta_{\text{Ag}}^{\text{Pt}} \varphi = \frac{\mu_e^{\text{Pt}} - \mu_e^{\text{Ag}}}{F}$$

$$\Delta_{\text{Pt}}^{\text{p}} \varphi = \frac{1}{F} \left(\frac{1}{2} \mu_{\text{H}_2} - \mu_e^{\text{Pt}} - \mu_{\text{H}^{+}}^{\text{p}} \right)$$

$$\Delta_{\text{p}}^{\text{Ag}} \varphi = \frac{1}{F} (\mu_{\text{AgCl}} + \mu_e^{\text{Ag}} - \mu_{\text{Cl}^{-}}^{\text{p}} - \mu_{\text{Ag}})$$

$$E = \frac{1}{F} \left(\frac{1}{2} \mu_{\text{H}_2} + \mu_{\text{AgCl}} - \mu_{\text{HCl}} - \mu_{\text{Ag}} \right) = \frac{-\Delta G}{F}$$

- Уравнение Нернста для ЭДС электрохимической цепи:

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{\prod a_i^{v_i}}{\prod a_j^{v_j}} \right)$$

- Температурный коэффициент ЭДС:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\Delta S}{nF}$$

Handbook of Chemistry and Physics / Electrochemical series

Reaction	E°/V
$\text{Ac}^{3+} + 3 e \rightleftharpoons \text{Ac}$	-2.20
$\text{Ag}^+ + e \rightleftharpoons \text{Ag}$	0.7996
$\text{Ag}^{2+} + e \rightleftharpoons \text{Ag}^+$	1.980
$\text{Ag}(\text{ac}) + e \rightleftharpoons \text{Ag} + (\text{ac})^-$	0.643
$\text{AgBr} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Br}^-$	0.07133
$\text{AgBrO}_3 + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{BrO}_3^-$	0.546
$\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{Ag} + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	0.4647
$\text{AgCl} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Cl}^-$	0.22233
$\text{AgCN} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{CN}^-$	-0.017
$\text{Ag}_2\text{CO}_3 + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{Ag} + \text{CO}_3^{2-}$	0.47
$\text{Ag}_2\text{CrO}_4 + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{Ag} + \text{CrO}_4^{2-}$	0.4470
$\text{AgF} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{F}^-$	0.779
$\text{Ag}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] + 4 e \rightleftharpoons 4 \text{Ag} + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$	0.1478
$\text{AgI} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{I}^-$	-0.15224
$\text{AgIO}_3 + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{IO}_3^-$	0.354
$\text{Ag}_2\text{MoO}_4 + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{Ag} + \text{MoO}_4^{2-}$	0.4573
$\text{AgNO}_2 + e \rightleftharpoons \text{Ag} + 2 \text{NO}_2^-$	0.564
$\text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{Ag} + 2 \text{OH}^-$	0.342
$\text{Ag}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{AgO} + 2 \text{OH}^-$	0.739
$\text{Ag}^{3+} + 2 e \rightleftharpoons \text{Ag}^+$	1.9
$\text{Ag}^{3+} + e \rightleftharpoons \text{Ag}^{2+}$	1.8
$\text{Ag}_2\text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + e \rightleftharpoons 2 \text{Ag} + 2 \text{H}_2\text{O}$	1.802
$2 \text{AgO} + \text{H}_2\text{O} + 2 e \rightleftharpoons \text{Ag}_2\text{O} + 2 \text{OH}^-$	0.607
$\text{AgOCN} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{OCN}^-$	0.41
$\text{Ag}_2\text{S} + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{Ag} + \text{S}^{2-}$	-0.691
$\text{Ag}_2\text{S} + 2 \text{H}^+ + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{Ag} + \text{H}_2\text{S}$	-0.0366
$\text{AgSCN} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{SCN}^-$	0.08951
$\text{Ag}_2\text{SeO}_3 + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{Ag} + \text{SeO}_4^{2-}$	0.3629

Reaction	E°/V
$\text{Al}(\text{OH})_4^- + 3 e \rightleftharpoons \text{Al} + 4 \text{OH}^-$	-2.328
$\text{H}_2\text{AlO}_3^- + \text{H}_2\text{O} + 3 e \rightleftharpoons \text{Al} + 4 \text{OH}^-$	-2.33
$\text{AlF}_6^{3-} + 3 e \rightleftharpoons \text{Al} + 6 \text{F}^-$	-2.069
$\text{Am}^{4+} + e \rightleftharpoons \text{Am}^{3+}$	2.60
$\text{Am}^{2+} + 2 e \rightleftharpoons \text{Am}$	-1.9
$\text{Am}^{3+} + 3 e \rightleftharpoons \text{Am}$	-2.048
$\text{Am}^{3+} + e \rightleftharpoons \text{Am}^{2+}$	-2.3
$\text{As} + 3 \text{H}^+ + 3 e \rightleftharpoons \text{AsH}_3$	-0.608
$\text{As}_2\text{O}_3 + 6 \text{H}^+ + 6 e \rightleftharpoons 2 \text{As} + 3 \text{H}_2\text{O}$	0.234
$\text{HAsO}_2 + 3 \text{H}^+ + 3 e \rightleftharpoons \text{As} + 2 \text{H}_2\text{O}$	0.248
$\text{AsO}_2^- + 2 \text{H}_2\text{O} + 3 e \rightleftharpoons \text{As} + 4 \text{OH}^-$	-0.68
$\text{H}_3\text{AsO}_4 + 2 \text{H}^+ + 2 e \rightleftharpoons \text{HAsO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$	0.560
$\text{AsO}_4^{3-} + 2 \text{H}_2\text{O} + 2 e \rightleftharpoons \text{AsO}_2^- + 4 \text{OH}^-$	-0.71
$\text{At}_2 + 2 e \rightleftharpoons 2 \text{At}^-$	0.3
$\text{Au}^+ + e \rightleftharpoons \text{Au}$	1.692
$\text{Au}^{3+} + 2 e \rightleftharpoons \text{Au}^+$	1.401
$\text{Au}^{3+} + 3 e \rightleftharpoons \text{Au}$	1.498
$\text{Au}^{2+} + e \rightleftharpoons \text{Au}^+$	1.8
$\text{AuOH}^{2+} + \text{H}^+ + 2 e \rightleftharpoons \text{Au}^+ + \text{H}_2\text{O}$	1.32
$\text{AuBr}_2^- + e \rightleftharpoons \text{Au} + 2 \text{Br}^-$	0.959
$\text{AuBr}_4^- + 3 e \rightleftharpoons \text{Au} + 4 \text{Br}^-$	0.854
$\text{AuCl}_4^- + 3 e \rightleftharpoons \text{Au} + 4 \text{Cl}^-$	1.002
$\text{Au}(\text{OH})_3 + 3 \text{H}^+ + 3 e \rightleftharpoons \text{Au} + 3 \text{H}_2\text{O}$	1.45
$\text{H}_2\text{BO}_3^- + 5 \text{H}_2\text{O} + 8 e \rightleftharpoons \text{BH}_4^- + 8 \text{OH}^-$	-1.24
$\text{H}_2\text{BO}_3^- + \text{H}_2\text{O} + 3 e \rightleftharpoons \text{B} + 4 \text{OH}^-$	-1.79
$\text{H}_3\text{BO}_3 + 3 \text{H}^+ + 3 e \rightleftharpoons \text{B} + 3 \text{H}_2\text{O}$	-0.8698
$\text{B}(\text{OH})_3 + 7 \text{H}^+ + 8 e \rightleftharpoons \text{BH}_4^- + 3 \text{H}_2\text{O}$	-0.481
$\text{Ba}^{2+} + 2 e \rightleftharpoons \text{Ba}$	-2.912

Электродный потенциал

Pt, H₂, p = 1 атм | HA, a_±=1 :: MA | M | Pt

Pt, H₂ | HCl :: раствор (I) | M₁ | Pt

Pt, H₂ | HCl :: раствор (I) | M₂ | Pt

Стандартные электродные потенциалы
(p = 1 атм, t = 25 °C, a = 1 моль/л)

Электрохимические ячейки

Двухэлектродная

$$U = E(WE) - E(CE) - IR$$

Напряжение

Трехэлектродная

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln a_{M^{z+}}$$

электрод I рода

$$E = E^0 - \frac{RT}{|z_-|F} \ln a_{A^{z-}}$$

электрод II рода

зависит от произведения
растворимости соли

Окислительно-восстановительный электрод: окисленная и восстановленная формы – в растворе. Материал электрода не участвует в реакции.

Газовый электрод: окисленной или восстановленной формой является молекула в газовой фазе, диссоциативно адсорбирующаяся на инертном электроде.

Электроды сравнения

Name	Equilibrium reaction and Nernst equation	Conditions	Potential (V vs. SHE)	T coefficient (mV °C ⁻¹)
Standard hydrogen electrode (SHE)	$2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- = \text{H}_2$	pH = 0	0.00	
	$E^\circ - 0.059 \text{ pH}$			
Silver chloride	$\text{AgCl} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{Cl}^-$	$a_{\text{Cl}^-} = 1$	0.2224	-0.6
	$E^\circ - 0.059 \log_{10} a_{\text{Cl}^-}$	0.1 M KCl	0.2881	..
		1.0 M KCl	0.235	..
		Saturated (KCl)	0.199	..
		Seawater	~0.250	..
Calomel	$\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2 \text{e}^- = 2 \text{Hg} + 2 \text{Cl}^-$	$a_{\text{Cl}^-} = 1$	0.268	
	$E^\circ - 0.059 \log_{10} a_{\text{Cl}^-}$	0.1 M KCl	0.3337	-0.06
		1.0 M KCl	0.280	-0.24
		Saturated	0.241	-0.65
Mercurous sulfate	$\text{Hg}_2\text{SO}_4 + 2 \text{e}^- = 2 \text{Hg} + \text{SO}_4^{2-}$	$a_{\text{SO}_4^{2-}} = 1$	0.6151	
	$E^\circ - 0.0295 \log_{10} a_{\text{SO}_4^{2-}}$			
Mercuric oxide	$\text{HgO} + 2 \text{e}^- + 2 \text{H}^+ = \text{Hg} + \text{H}_2\text{O}$		0.926	
	$E^\circ - 0.059 \text{ pH}$			
Copper sulfate	$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- = \text{Cu}$ (sulfate solution)	$a_{\text{Cu}^{2+}} = 1$	0.340	
	$E^\circ + 0.0295 \log_{10} a_{\text{Cu}^{2+}}$	saturated	0.318	

TABLE 5.3 Standard Potentials ($E^\circ + E_j$) and Temperature Coefficients for Cells of the Type (Pt)/H₂, H₃O⁺ ($a = 1$)||KCl/MCl(satd.)/M

MCl/M	KCl	$E^\circ + E_j$ (V at °C)							$\frac{d(E^\circ + E_j)}{dt}$
		10	15	20	25	30	35	40	(mV deg ⁻¹ at 25°C)
AgCl/Ag	3.5 M (at 25°C)	0.215	0.212	0.208	0.205	0.201	0.197	0.193	-0.73
	Satd.	0.214	0.209	0.204	0.199	0.194	0.189	0.184	-1.01
Hg ₂ Cl ₂ /Hg	0.1 M (at 25°C)	0.336	0.336	0.336	0.336	0.335	0.334	0.334	-0.08
	1.0 M (at 25°C)	0.287	—	0.284	0.283	0.282	—	0.278	-0.29
	3.5 M (at 25°C)	0.256	0.254	0.252	0.250	0.248	0.246	0.244	-0.39
	Satd.	0.254	0.251	0.248	0.244	0.241	0.238	0.234	-0.67

Электроды сравнения

Обратимый водородный электрод

Электроды сравнения

	Reference electrode	Potential versus SHE, V (aqueous systems, recommended values for 25°C)	Analogues	Media
<u>Стандартный водородный</u>				
<u>Каломельный</u>	Calomel electrodes		Mercurous bromide,	aqueous
<u>насыщенный</u>	saturated (SCE)	0.241(2)	iodide, iodate, acetate,	and mixed (with
<u>нормальный</u>	normal (NCE)	0.280(1)	oxalate electrodes	alcohols or dioxane)
<u>децинормальный</u>	decinormal	0.333(7)		
<u>Хлорсеребряный</u>	Silver-chloride electrode (saturated KCl)	0.197(6)	Silver cyanide, oxide, bromate, iodate, perchlorate;	aqueous, mixed, abs. alcoholic
<u>Ртутносльфатный</u>	Mercury-mercurous sulphate electrode	0.6151(5)	nitrate	aprotic
	Mercury-mercuric oxide electrode	0.098	Ag/Ag ₂ SO ₄ , Pb/Pb ₂ SO ₄	aqueous, mixed
<u>Оксиднортутный</u>				
<u>Хингидронный</u>	Quinhydrone electrode		chloranil, 1,4-naphtoquinhydrone	any with sufficient solubility of components
	0.01 M HCl	0.586(8)		
	0.1 M HCl	0.641(4)

Неводные электроды сравнения

Solvent	Reference no:	ΔE (Ferrocene-bis(biphenyl)-chromium(I))
1,2-Dichloroethane	(11)	1.13 ₁ ^(b)
Dichloromethane	(11) ^(d)	1.14 ₈ ^(b) 1.15 ₂ ^(c)
Nitromethane	(11)	1.11 ₂
Nitrobenzene	(11)	1.13 ₀
Acetonitrile	(11)	1.11 ₈ ^(b) 1.11 ₉
Propylene carbonate	(11)	1.11 ₄
Butyrolactone	(11)	1.11 ₂
Acetone	(11)	1.13 ₀
Methanol	(11)	1.13 ₄
Ethanol	(11)	1.13 ₄

RECOMMENDATIONS ON REPORTING ELECTRODE POTENTIALS IN NONAQUEOUS SOLVENTS

(Recommendations 1983)

Prepared for publication by
G. GRITZNER¹ and J. KÜTA^{2†}

$$nFE = [G(Ox) - G(Red)]_{gas} + \underbrace{[G_S(Ox) - G_S(Red)]}_{sol}$$

МИНИМИЗИРОВАТЬ

Pure & Appl. Chem., Vol.56, No.4, pp.461-466, 1984.
Printed in Great Britain.

- Для идеального раствора

$$\text{grad } \varphi = \frac{D_- - D_+}{z_+ D_+ + |z_-| D_-} \frac{RT}{F} \frac{\text{grad } c}{c} \quad D_i = \frac{RT}{|z_i| F} u_i$$

$$\Delta \varphi_{\text{дифф}} = \frac{D_- - D_+}{z_+ D_+ + |z_-| D_-} \frac{RT}{F} \ln \frac{c_2}{c_1} \quad t_i = \frac{u_i}{\sum u_i}$$

$$\Delta \varphi_{\text{дифф}} = (t_- - t_+) \frac{RT}{F} \ln \frac{c_2}{c_1} \quad \text{1,1-электролит (уд.)}$$

$$\Delta \varphi_{\text{дифф}} = \frac{D_- - D_+}{z_+ D_+ + |z_-| D_-} \frac{RT}{F} \ln \frac{c_2}{c_1} = -\frac{RT}{F} \left(\frac{t_-}{z_-} + \frac{t_+}{z_+} \right) \ln \frac{c_2}{c_1}$$

- В общем виде:

$$\Delta \varphi_{\text{дифф}} = -\frac{RT}{F} \int_I^II \sum \frac{t_i}{z_i} d \ln a_i$$

Активности отдельных ионов?
Распределение концентраций?

М.Планк (1890 г.)

$$\xi = \exp\left(\frac{F \Delta \varphi_{\text{дифф}}}{RT}\right) = \frac{\xi \sum (\lambda_+^0 c_+^{\prime\prime}) - \sum (\lambda_+^0 c_+^{\prime})}{\sum (\lambda_-^0 c_-^{\prime\prime}) - \xi \sum (\lambda_-^0 c_-^{\prime})} = \frac{\ln\left(\frac{\sum c_i^{\prime\prime}}{\xi \sum c_i^{\prime}}\right) (\xi \sum c_i^{\prime\prime} - \sum c_i^{\prime})}{\ln\left(\frac{\xi \sum c_i^{\prime\prime}}{\sum c_i^{\prime}}\right) (\sum c_i^{\prime\prime} - \xi \sum c_i^{\prime})}$$

П.Гендерсон (1907-1908 гг.)

$$\Delta \varphi_{\text{дифф}} = \frac{RT}{F} \frac{\sum \left[\frac{\lambda_i^0}{z_i} (c_i^{\prime\prime} - c_i^{\prime}) \right]}{\sum [\lambda_i^0 (c_i^{\prime\prime} - c_i^{\prime})]} \ln \frac{\sum (\lambda_i^0 c_i^{\prime})}{\sum (\lambda_i^0 c_i^{\prime\prime})}$$

Электрохимические цепи строго равновесны, лишь тогда, когда они не содержат ни одной границы двух различных растворов

- цепь с переносом

$$\Delta\varphi_{\text{дифф}} = -\frac{RT}{F} \int_I^{II} \sum \frac{t_i}{z_i} d \ln a_i$$

Солевой мостик – для нивелирования диффузионного потенциала (KCl, NH₄NO₃)

Элемент Вестона – цепь без переноса

$$E (20^\circ C) = 1.0183 \text{ В}$$

$$dE/dt = -4 \cdot 10^{-5} \text{ В/град}$$

1) Физические цепи

- аллотропические

$$E = \frac{M_{\text{Hg}} g \Delta h}{1000F}$$

- гравитационные

2) Концентрационные цепи

$$E = \Delta_{\text{M}}^{\text{p1}} \varphi + \Delta_{\text{p1}}^{\text{p2}} \varphi + \Delta_{\text{p2}}^{\text{M}} \varphi$$

$$E = t_- \frac{3RT}{2F} \ln \frac{a_{\pm(2)}}{a_{\pm(1)}}$$

3) Химические цепи

- элемент Даниэля-Якоби

Диаграммы Пурбэ (M. Pourbaix)

$$E^0 = -1.17 \text{ B}$$

$$E^0 = +1.69 \text{ B}$$

$$E^0 = +0.60 \text{ B}$$

$$E^0 = -1.56 \text{ B}$$

Стеклянный электрод

- Между стеклянной стенкой и водным раствором возникает разность потенциалов

$$E_{\text{СТ}} = E_{\text{acc}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_2}{a_1}$$

$$E_{\text{СТ}} = E_{\text{СТ}}^0 + \frac{RT}{F} \ln a_2$$

Домашнее задание - 4

Растворы:

(правый) $0.5 \text{ M CuSO}_4 + 0.1 \text{ M H}_2\text{SO}_4$
(левый) $0.02 \text{ M ZnSO}_4 + 0.05 \text{ M H}_2\text{SO}_4$

Точность взвешивания: 0.0002 г

Точность измерения объема: 0.1 мл

Размеры электродов: $1.2 \times 3.0 \text{ см}^2$

Объем растворов: 50 мл + 50 мл

Растворы разделены пористой стеклянной перегородкой. Измерение разности потенциалов проведено через 1 мин после сборки ячейки.

Задание:

Рассчитайте ЭДС ячейки и перечислите все факторы, определяющие отличия измеренного и рассчитанного значения разности потенциалов. В какую сторону (в большую или в меньшую) изменится разность потенциалов через час и почему?